



## التوائم ( بواسطة mohsen التهاب عصب الوجه الخامس ( عصب مثلث

التهاب عصب الوجه الخامس

( عصب مثلث التوائم )

هي حالة مرضية

لأسباب غير معروفة عامة غالباً ما تصيب كبار السن وعادة ما تكون على جهة واحدة من  
الوجه.

تمثل آلام العصب الخامس أشد وأقصى أنواع الألم التي يمكن أن تمر على

الإنسان خلال حياته . وتصيب الإنسان غالباً فوق الخمسين من العمر ولكنه هناك حالات

كثيرة سجلت تحت الثلاثين وأيضاً في الأطفال

والصفات الإكلينيكية للألم هي مفتاح التشخيص الأساسي في حالات آلام العصب الخامس . ويكون الألم في

المكان الجغرافي لتوزيع العصب الخامس ويصيب الفرع الفكي أكتد من الفرع الفكي أكتد من الفرع الصدغي

وأكتد من الفرع العيني وقد يصيب فرعيه معا أو أكتد ويعتبر إصابة الفرع الفكي والفرع الصدغي معا أو

الأكتد حدوثاً . والإصابة في العصب الخامس غالباً في جهة واحدة وقد يحدث في ٣ % من حالاته أن يكون الألم

في ناحيتي الوجه . ولقد لوحظ أن الإصابة في العصب الخامس أكتد حدوثاً في الجهة اليمنى من الجهة اليسرى

دون أي تفسير علمي لذلك .

والألم يكون قاطعاً أو طاعناً و مثل التيار الكهربائي يصيب الشخص لمدة ثواني

قليلة ثم يختفي ليظهر من جديد ويأتي الألم ويختفي بطريقة مفاجئة . ويعتبر الارتباط الزمني لآلام العصب

الخامس مميز له حيث يأتي الألم بصورة متقطعة ويستمر الألم لفترة أسابيع أو شهور ثم يستمر المريض فترة

دون مهاجمة الألم قد تطول إلى سنوات .

ويقل معدل حدوث نوبات الألم مع التقدم في سن المريض . ويبدأ

الألم عند القيام بأعمال ليست أبدا مصدرا للألم مثل غسيل الوجه أو تنشيفه أو عند حلاقة الذقن أو المضغ

أو البلع أو استخدام فرشاة الأسنان أو التعرض للتيار الباردة . والألم في هذه الحالات يزداد باستخدام

طرق تستخدم كثيرا في تخفيف الألم مثل التدليك أو الضغط على المنطقة المؤلمة أو استخدام الكمادات

الباردة أو الدافئة فكل ذلك يؤدي إلى بداية الألم أو زيادته في حالات آلام العصب الخامس .

فحص مريض

آلام العصب الخامس :

في وجود الحساسية الشديدة للأنسجة في منطقة الألم فإنه يصعب فحص منطقة الألم

ولكن يبدو المريض هزيلا لقلة الأكل خوفا من المضغ والبلع وشعر ذقنه طويل خوفا من حلاقة الشعر وتجويف

الفم غير معتنى به لصعوبة استخدام الفرشاة والمعجون لأن كل ذلك قد يكون الحافز لبداية نوبة آلام العصب

الخامس . والفحص العصبي للمريض قد لا يؤدي إلى وجود أي تغيير في الإحساس في المناطق المصابة .

والفحوصات المتقدمة قد لا تكون ضرورية إلا أن الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي قد يظهر وجود أوعية دموية

غير عادية حول نواة العصب الخامس أو وجود أورام في منطقة جذع المخ .

علاج حالات آلام العصب

الخامس

هناك تركيبة خاصة من الطب التجانسي تتكون من ١٣ مادة

التراكيز فيها تفصل حسب عمر

المريض

وشدة المرض

اتصل ٩٥٠٩١٧٩٩٥٠٧٩٠٠

ما بين الساعة ٨ صباحا الى ٨ مساء بتوقيت مكة

المكرمه

لكنها لا تساوي ليلة في الالم الذي يصيب الوجه

نسبة النجاح تتراوح بين ٠.١-٥٩% حسب عمر

المريض

او الامراض المصاحب بها مثل السكري والضغط

لكن الكلى يتحسن عليها

ودمتم سالمين